




Itinerario de vacunación para niños y adolescentes 0 a 18 años de edad 2018

VACUNAS	Birth	1 mes	2 meses	4 meses	6 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	19-23 meses	2-3 años	4-6 años	7-10 años	11-12 años	13-15 años	16 años	17-18 años
Hepatitis B ¹ (HepB)	1 ^{ra} dosis	← 2 ^{da} dosis →		← 3 ^{ra} dosis →													
Rotavirus ² (RV) RV1 (Serie 2 dosis); RV3 (Serie 3 dosis)			1 ^{ra} dosis	2 ^{da} dosis	Ver nota al calce 2												
Difteria, tétanos y pertusis acelular ³ (DTaP:<7años)			1 ^{ra} dosis	2 ^{da} dosis	3 ^{ra} dosis	← 4 ^{ta} dosis →			5 ^{ta} dosis								
Haemophilus Influenzae tipo b ⁴ (Hib)			1 ^{ra} dosis	2 ^{da} dosis	Ver nota al calce 4	3 ^{ra} o 4 ^{ta} dosis Ver nota 4											
Neumococo Conjugado ⁵ (PCV13)			1 ^{ra} dosis	2 ^{da} dosis	3 ^{ra} dosis	← 4 ^{ta} dosis →											
Polio Inactivado ⁶ (IPV:<18 años)			1 ^{ra} dosis	2 ^{da} dosis	← 3 ^{ra} dosis →				4 ^{ta} dosis								
Influenza ⁷ (IIV)	Vacunación Anual (Solo IIV) 1 o 2 dosis												Vacunación Anual (IIV) 1 dosis				
Sarampión Común, Sarampión Alemán, Paperas ⁸ (MMR)			Ver nota 8			← 1 ^{ra} dosis →			2 ^{da} dosis								
Varicela ⁹ (VAR)						← 1 ^{ra} dosis →			2 ^{da} dosis								
Hepatitis A ¹⁰ (HepA)									← Serie 2 dosis, Ver nota 10 →								
Meningococo ¹¹ MenACWY-D≥9meses; MenACWY-CRM≥2meses)	Ver Nota 11												1 ^{ra} dosis	2 ^{da} dosis			
Tétanos, Difteria, Pertusis acelular ¹³ (Tdap:≥7años)													Tdap				
Virus del Papiloma Humano ¹⁴ (2vVPH;niñas; 4vVPH, 9vVPH varones y niñas)													Ver nota 14				
Meningococo B ¹²													Ver nota 12				
Neumococo polisacarida ⁵ (PPSV23)													Ver nota 5				

Edad recomendada para todos los niños
 Edad recomendada para alcanzar a aquellos con vacunación incompleta
 Recomendaciones para grupos de alto riesgo
 Edad recomendada para vacunación en decisiones clínicas / individuales
 NO recomendación

Este itinerario indica las edades recomendadas para la administración rutinaria de vacunas para los niños y adolescentes. Cualquier dosis de vacunas no administradas en la edad recomendada debe administrarse durante cualquier visita subsiguiente cuando así se indique y sea posible.


Rafael Rodríguez Mercado, MD, FAANS, FACS
 Secretario, Departamento de Salud