



Itinerario de vacunación para niños y adolescentes 0 a 18 años de edad 2018

VACUNAS	Birth	1 mes	2 meses	4 meses	6 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	19-23 meses	2-3 años	4-6 años	7-10 años	11-12 años	13-15 años	16 años	17-18 años
Hepatitis B ¹ (HepB)	1 ^{ra} dosis ← 2 ^{da} dosis →				←	3 ^{ra} dosis →											
Rotavirus ² (RV) RV1 (Serie 2 dosis); RV3 (Serie 3 dosis)			1 ^{ra} dosis 2 ^{da} dosis Ver nota al calce 2														
Difteria, tétanos y pertusis acelular ³ (DTaP)<7años)			1 ^{ra} dosis 2 ^{da} dosis 3 ^{ra} dosis			← 4 ^{ta} dosis →					5 ^{ta} dosis						
Haemophilus influenzae tipo b ⁴ (Hib)			1 ^{ra} dosis 2 ^{da} dosis Ver nota al calce 4			3 ^{ra} o 4 ^{ta} dosis Ver nota 4											
Neumococo Conjugado ⁵ (PCV13)			1 ^{ra} dosis 2 ^{da} dosis 3 ^{ra} dosis		← 4 ^{ta} dosis →												
Polio Inactivado ⁶ (PV<18 años)			1 ^{ra} dosis 2 ^{da} dosis	←	3ra dosis	→					4 ^{ta} dosis						
Influenza ⁷ (IV)					Vacunación Anual (Solo IV) 1 o 2 dosis							Vacunación Anual (IV) 1 dosis					
Sarampión Común, Sarampión Alemán, Paperas ⁸ (MMR)				Ver nota 8	← 1 ^{ra} dosis →						2 ^{da} dosis						
Varicela ⁹ (VAR)					← 1 ^{ra} dosis →						2 ^{da} dosis						
Hepatitis A ¹⁰ (HepA)					← Serie 2 dosis, Ver nota 10 →												
Meningococo ¹¹ MenACWY-D29meses; MenACWY-CRM2-2meses)					Ver Nota 11							1 ^{ra} dosis	2 ^{da} dosis				
Tétanos, Difteria, Pertusis acelular ¹² (Tdap)<7años)												Tdap					
Virus del Papiloma Humano ¹³ (2vVPH/níñas; 4vVPH, 9vVPH varones y niñas)												Ver nota 14					
Meningococo B ¹⁴												Ver nota 12					
Neumococo polisacárido ¹⁵ (PPSV23)												Ver nota 5					

█ Edad recomendada para todos los niños█ Edad recomendada para alcanzar a aquellos con vacunación incompleta█ Recomendaciones para grupos de alto riesgo█ Edad recomendada para vacunación en decisiones clínicas / individuales█ NO recomendación

Este itinerario indica las edades recomendadas para la administración rutinaria de vacunas para los niños y adolescentes. Cualquier dosis de vacunas no administradas en la edad recomendada debe administrarse durante cualquier visita subsiguiente cuando así se indique y sea posible.

Rafael Rodríguez Mercado, MD, FAANS, FACS
Secretario, Departamento de Salud