

RECOMENDACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL HOSPITAL PARA UNA PANDEMIA DE INFLUENZA

Fuente: Plan para la Influenza Pandémica del Departamento de Salud Federal (HHS por sus siglas en inglés)

Nivel de Influenza Pandémica	Acciones Sugeridas
<p>Período Interpandémico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Establezca un comité interno de planificación • Lleve a cabo el proceso de planificación • Realice actividades de educación y adiestramiento del personal • Lleve a cabo vigilancia para influenza de temporada en el hospital
<p>Período de Alerta Pandémica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incremente la preparación; refine el plan local • Lleve a cabo vigilancia para influenza de temporada en el hospital
<p>Período Pandémico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Influenza pandémica fuera de los EE.UU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Establezca contacto con socios clave de la salud pública, el cuidado de la salud y la comunidad. • Implante vigilancia hospitalaria para la influenza pandémica en pacientes entrantes y pacientes previamente admitidos. • Implante un sistema para la detección temprana y el tratamiento del personal del cuidado de la salud que podría estar infectado con la cepa pandémica de la influenza. • Refuerce los procedimientos de control de infecciones para evitar la propagación de la influenza • Acelere el adiestramiento del personal de acuerdo con el plan de educación y adiestramiento de la influenza pandémica con que cuente la instalación.
<ul style="list-style-type: none"> • Influenza pandémica en los EE.UU. 	<p>Todo lo anterior, más:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implante actividades para incrementar la capacidad; complementar al personal, y proveer suministros y equipo. • Mantenga un contacto estrecho con y entre instalaciones del cuidado de la salud y con departamentos de salud estatales y locales. • Coloque rótulos con el protocolo de la higiene respiratoria/tos. • Mantenga altos niveles de sospecha de que los pacientes que se presentan con una enfermedad parecida a la influenza podrían estar infectados con la cepa pandémica. <p>(Si la cepa epidémica se detecta en un paciente a nivel local, podría suponerse la transmisión a la comunidad, y el hospital pasaría al próximo nivel de respuesta).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Influenza pandémica en el área local 	<p>Todo lo anterior, más:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Emergencia (DE) • Establezca áreas de espera separadas para personas con síntomas de influenza.

- Implante triage telefónico para desanimar la visitas innecesarias a DE/departamento de pacientes ambulatorios.
 - Haga cumplir estrictamente el protocolo de la higiene respiratoria/tos.
 - Controles de acceso
 - Limite el número de visitantes a los esenciales para el apoyo al paciente.
 - Examine a todos los visitantes a la entrada de la instalación en busca de señales y síntomas de influenza.
 - Limite las entradas a la instalación y asigne personal clínico al control de la entrada.
 - Admisiones a hospitales
 - Suspenda procedimientos y admisiones electivas hasta que disminuya la epidemia local.
 - Dé de alta a los pacientes lo antes posible.
 - Agrupe a los pacientes admitidos con influenza.
 - Monitoree la transmisión nosocomial.
 - Prácticas en el personal
 - Considere licencia o reasignación del personal en estado de gestación y otro personal de alto riesgo por complicaciones con la influenza.
 - Considere reasignar al personal no esencial en apoyo a servicios hospitalarios críticos, u otorgarle licencia administrativa; agrupe al personal que cuida de pacientes con influenza.
 - Considere asignar al personal que se recupera de la influenza a cuidar de pacientes con influenza.
 - Implante un sistema para detectar y reportar señales y síntomas de influenza en el personal que se reporte al trabajo.
 - Suministre profilaxis antivírica al personal, según las recomendaciones del HHS
-
- Transmisión nosocomial

Todo lo anterior, más, si la transmisión nosocomial se limita a, sólo, un número reducido de unidades de la instalación,

 - Cierre las unidades donde ha habido transmisión nosocomial.
 - Agrupe al personal y los pacientes.
 - Limite nuevas admisiones (salvo las de otros pacientes de influenza pandémica).
 - Limite los visitantes a las unidades afectadas a aquéllos que sean esenciales para el cuidado y el apoyo de los pacientes.
-
- Transmisión generalizada en la comunidad y el hospital; admisiones de pacientes en medio de movilización ante un evento extraordinario

Todo lo anterior, más:

 - Redirija los recursos de personal para apoyar el cuidado de los pacientes (i.e., personal clínico administrativo, personal clínico que trabaja en departamentos que han estado cerrados [i.e., terapia física/ocupacional, cateterización cardiaca]).
 - Reclute a voluntarios de la comunidad (i.e. enfermeras registradas y médicos, personal clínico que trabaje en escenarios ambulatorios).
 - Considere otorgar licencia administrativa a todo el personal no esencial que no pueda reasignarse como apoyo a servicios hospitalarios críticos.